

Komarci na području Osječko-baranjske županije

Culex pipiens - urbani komarac (razmnožava se u bačvama u dvorištu i blizini kuća, kanalizacijskim oknima i dr.), najrasprostranjenija vrsta na svijetu, aktivni su tijekom cijele godine, raspon leta je do 300 m od legla.

Aedes vexans - komarac poplavnih područja, najbrojnija vrsta na našem području. Raspon leta im je do 30 km. Jajašca mogu prezimiti niske temperature na području u kojem se u proljeće očekuje voda.

Ochlerotatus sticticus - komarac poplavnih područja, drugi po zastupljenosti na našem području. Ženke su najaktivnije u sumrak. Jajašca mogu preživjeti 3 do 5 godina. Raspon leta je oko 12 km.

Aedes albopictus (azijski tigrasti komarac) - invazivna vrsta prepoznatljiva po srebrnoj crti na prsnom košu (thorax-u), aktivni su tijekom cijelog dana, raspon leta im je do 300 m od legla.

Aedes japonicus - invazivna vrsta koja nastanjuje urbana područja. Ženke su aktivne tijekom cijelog dana i imaju sposobnost prijeći velike udaljenosti. Otporni su na zimske temperature u umjerenom klimatskom pojasu.



Zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije

Za više informacija kontaktirajte
Službu za dezinfekciju, dezinsekciju i
deratizaciju

Tel: 031/225721

Drinska 8, OSIJEK

e-mail: zzjzddd@gmail.com

www.zzjosijek.hr



Z A Š T I T A O D
KOMARACA
N A K U Ć N O M P R A G U




Zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije

KOMARCI SU PRIJENOSNICI OZBILJNIH BOLESTI

Kao što su Zika virus, virus Zapadnog Nila, malarija, dengue groznica, chikungunya groznica, žuta groznica te različiti tipovi encefalitisa

Životni ciklus komarca



Mjesta razmnožavanja

Komarci za razmnožavanje trebaju vodu stajaćicu i povoljne vremenske uvjete (temperaturu i vlagu).

Provjerite!

Ženke komaraca polažu jajašca u različite spremnike, bačve, žlijebове, lokve i sl. Provjerite navedene oblike koji mogu zadržati vodu u vašoj okolini.

Očistite!

Kada ste provjerili spremnike i druge predmete koji mogu zadržati vodu, iste je potrebno očistiti jer jajašca mogu biti na stjenkama spremnika i sl.

Prekrijte ili ispraznite spremnike koji mogu zadržati vodu

Poduzimanjem ovih mjera spriječit će te polaganje jajašaca. To ne moraju biti samo spremnici nego mogu biti i kanalizacijska okna, žlijebovi na kući, stare gume, vaze za cvijeće, neispravne slavine, slivnici i sl.

Zaštitite se od uboda

Nosite odjeću dugih rukava i nogavica te koristite repelente za dodatnu zaštitu. Budite oprezni prilikom nanošenja repelenta (koristite ga prema uputama proizvođača). Postavite mrežice ili gusto tkane zavjese na prozore i vrata kuće. Komarci su najaktivniji u zoru i sumrak.

PROBLEMATIČNA MJESTA U VRTU GDJE MOGU NASTATI LEGLA KOMARACA

